FICHE D'USAGE
USAGES GENERAUX

Mise à jour : 03/07/2025

Vue d'ensemble des substances de base et de leurs usages autorisés (usages généraux)

Nom de la substance	Fonction	Cible
Peroxyde d'hydrogène	Désinfection des outils	Bactéries du sol transmises par les outils
Vinaigre	Désinfection des outils Correcteur de pH pour la substance de base Chitosan	-
Lait de vache	Désinfection des outils et gants	Virus
Lactosérum	Désinfection des outils et gants	Virus
Bière	Molluscicide	Escargots et limaces

Toutes ces substances de base sont autorisées en agriculture biologique, à l'exception des substances marquées du logo

Substance	F G I[1]	Cible	Application				Dose d'application par traitement		
			Méthode	Période	Nombre d'applications	Intervalle entre applications	g de s.a. par hL de préparation	Volume d'eau final à l'ha	g de s.a. par ha
Bière	F	Escargots et limaces	Pièges à Limaces Obligatoire	Au début de l'infestation	1 à 5	10 jours min	Pur prêt à l'emploi	-	-
Peroxyde d'hydrogène	F G	Bactéries du sol *Ralstonia Solanacearum* Botrytis *Botrytis cinerea*	Désinfection d'outils	-	-	-	-	-	-

[1] *F = field (plein champ) ; G = greenhouse (sous serre) : I = indoor (en bâtiment fermé)*

Substance	F G I[1]	Cible	Application				Dose d'application par traitement		
			Méthode	Période	Nombre d'applications	Intervalle entre applications	g de s.a. par hL de préparation	Volume d'eau final à l'ha	g de s.a. par ha
Vinaigre	F G	-	Correcteur de pH pour Chitosan	-	1	-	-	-	-
Vinaigre	F G	-	Désinfection d'outils	-	1 par jour à avant chaque utilisation		4 ‰ = 400 g/hl	-	-
Lactosérum Petit-lait	F G	Virus	Désinfection d'outils et gants	-	1 avant chaque utilisation		5% = 50 g/L	-	-

[1] *F = field (plein champ) ; G = greenhouse (sous serre) : I = indoor (en bâtiment fermé)*

Substance	F G I[1]	Cible	Application				Dose d'application par traitement		
			Méthode	Période	Nombre d'applications	Intervalle entre applications	g de s.a. par hL de préparation	Volume d'eau final à l'ha	g de s.a. par ha
Lait de vache	F G	Virus	Désinfection d'outils et gants	-	1 avant chaque utilisation		5% = 50 g/L	-	-

Rédaction
Hortense LEJEUNE

Supervision
Stéphanie CLÉMENT-PHILIPPE

Conception graphique
Service communication ITAB

Pour citer ce document :
ITAB 2025 - Fiche d'Usage substances de base filière Usages généraux

[1] *F = field (plein champ) ; G = greenhouse (sous serre) : I = indoor (en bâtiment fermé)*